Repellentien:

Latroxin Delta

<i>Hersteller:</i>	Serumwerke Bernburg
<i>Wirkstoff:</i>	Deltamethrin
<i>Dosierung:</i>	Rind 10 ml/100kg KGW Schaf 10 ml/Tier
<i>Dauer der Anwendung:</i>	Ein dauerhafter Schutz von aufgestallten Tieren wird durch die Wiederholung der Behandlung nach jeweils 6-10 Wochen erreicht.
<i>Wartezeit:</i>	Rinder (essbare Gewebe: 18 Tage, Milch: 0 Tage) Rinder: milchliefend (essbare Gewebe: 18 Tage, Milch: 0 Tage) Schafe (essbare Gewebe: 12 Tage, Milch: 1 Tag) Hinweis: Milch 12 Stunden

Bayofly Pour-on

<i>Hersteller:</i>	Bayer
<i>Wirkstoff:</i>	Cyfluthrin
<i>Besondere Hinweise:</i>	nicht bei Kälber anwendbar, für Schafe nicht zugelassen
<i>Dosierung:</i>	0,2 mg/kg KGW bzw. 10ml/500 kg KGW
<i>Dauer der Anwendung:</i>	nach 4-6 Wochen wiederholen
<i>Wartezeit:</i>	Rinder (essbare Gewebe: 0 Tage, Milch: 0 Tage) Rinder: milchliefend (essbare Gewebe: 0 Tage, Milch: 0 Tage)

Flectron

<i>Hersteller:</i>	Forte Dodge
<i>Wirkstoff:</i>	Cypermethrin
<i>Besondere Hinweise:</i>	nur auf der Weide anwendbar, keine Zulassung für milchliefende Tiere
<i>Dosierung:</i>	1 Clip/Tier
<i>Dauer der Anwendung:</i>	4-5 Monate Wirkzeit
<i>Wartezeit:</i>	Essbares Gewebe: 0

Butox pour-on

<i>Hersteller:</i>	Intervet Deutschland GmbH
<i>Wirkstoff:</i>	Deltamethrin

Dosierung und besondere Hinweise:

Rinder: 10ml/100kg KGW

Schafe: 10 ml Butox 7,5 mg/ml pour on pro Tier

Ziege: 10 ml Butox 7,5 mg/ml pour on pro Tier

Ein dauerhafter Schutz von aufgestallten Tieren wird durch die Wiederholung der Behandlung nach jeweils 6 - 10 Wochen erreicht. Der Einfluss der Witterung auf die Dauer der Wirksamkeit ist nicht untersucht.

Wartezeit: Rinder (essbare Gewebe: 18 Tage, Milch: 0 Tage)
Hinweis: alle Altersstufen
Schafe (essbare Gewebe: 1 Tag, Milch: 0 Tage)
Hinweis: Milch 12 Stunden